n° 59.

Memoire

Sur Le programme

De L'année 1739

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

ARC 51 n°-17

programme Pour quoy Certaines tumeurs doivent
estre extirpez, et Dautres Simplement
Ouuertes, Dans Lune et Lautre de Ces
Operations, quels Sont Les Cas, ou
Le Cautere est preferable, a
Linstrument tranchant: et Les raisons
de preference

Pour donner une Solution a Ce programme
Il faut Considerer, ez Chirurgie deux Circonstances
que se trouvent dans Le Cautere, Scauoir Lemedicament
et Linstrument
Dans Lemedicament ez y trouue La maladie, Ses Causes
Signes, et Les Remedes Convenables
Dans Linstrument Lopération, La maniere de La
faire et Surement faire
Les Cas ou Il est preferable a linstrument tranchant,
Ladvantage, et Lutilité qui ez Chirurgie ez doit retirer
et Les meaux Inconveniens quil doit euiter
raisons de preference
Les Circonstances que demandent Ladvantage des Remedes
Leurs succés, et La prompte queriso de La maladie
toutes ces Circonstances Liées et Jointes
ensemble doivent faire parler dun
Vn Chirurgien

Pourquoy Certaines tumeurs doivent
estre extirpez; quels sont Les Cas, ou
Le Cautere est preferable a linstrument
tranchant. et Les Raisons de preference

Lexperience Journaliere de la Chirurgie nous
apprend que Les tumeurs qui peuuent et doivent estre
extirpez par Le Cautere par preference a linstrument
tranchant, Sont toutes Celles dont La matiere ou

ARCSI n° 17

Les enflammées sont des Hirtes, Tumeur pleureuse, glandes
endurcies et celles qui ne contiennent aucune
matiere

Les tumeurs en Hirtes sont La Loupe, Latyrome,
Steatome, Melicéris, Ganglion, Atheroma et
Tonüe, Steatozeatome et Meliceris

Les tumeurs faites d'humeurs pleureuses, sont celles
qui viennent a la suitte d'une fluxion d'egoutte fixée
sur une partie, et quelquefois remontée et arrestée

Les glandes, sont celles du col, des mammelles, et
celles des autres parties, endurcies, lorsqu'elles
sont squireuses Cancereuses, ou Carcinomateuses

Les tumeurs qui ne contiennent aucune
matiere sont les Varices, Le fungus, le Varocele et
le Hydrocele qui arrivent pour lordinaire, a certaines glandes
excretoires et a certaines parties

Leurs Causes Interieures ou visible sont Sang
vicieux Sang qui pesche, par abondance, viscosité ou acrimonie
une limphe epaisse, acre et pour ainsy dire sanieuse
ou une nourriture epaisse et denuée de son beaume

Ces quatre Causes Interieures jointes, et Exterieures quelques
Coups, efforts, Compressions, et quelques fois Preoccupées
sont les Causes generales des tumeurs

Ces tumeurs en general arrivent pour lordinaire plus
volontiers par congestion, que par fluxion et determinent
dans cegenre par rendurcissement

Ozer etrope Les tumeurs en Hirtes

La loupe Latyrome Le Steatome, et le melicéris
Ces tumeurs faites de lobstruction des vaisseaux, qui empesche
le sang de circuler dans Sacca de la veine et des
Conduits de la veine de la Reticulaire de la Cutée Lequel
Sang vicié de couleur et de Consistence, fait donner differents
noms a la tumeur, comme atheroma, Steatome, melicéris
Lorsquil Ressemble a la bouillie, au suif et au miel
Les quelles tumeurs enfermées dans une poche cellulaire
dure appellée Hirte, arrosée de plusieurs petits vaisseaux

formes La loupe, comme les autres tumeurs de Mauvais, elles deviennent plus ou moins dures, le loin que les kistes ont plus ou moins de liberté de se mouvoir

Ils attaquent pour lordinaire La Tête, les Testicules, les bras ou Les Jambes

Lors quelles sont formées elles Entendent par Leur volume plus ou moins Considerable, Le mouvement de la partie, cause de la douleur, et de linquietude au malade, segenne le Cours Sanguins, dans les differentes parties ou elles sont situées Circonstances qui engagent Le Chirurgien dans Leurs differents temps de les enlever

dans La loupe Le Couteau en preferable a linstrument tranchant

1°. si Le kiste en adherent sur la ponevrose ou quelques muscles Considerables ce qui fait corps avec elle

2°. sur le plan situement des vaisseaux, 3°. sur le defaut d'entrelassement de plusieurs vaisseaux, qui la nourissent et Lentretiennent, ou lorsque quantité d'arteres Les tegumens dans Louverture faite avec Linstrument tranchant etonne Le Chirurgien dans Les operations; 4°. lorsque quelques gros troncs de vaisseaux, 5°. si Les Racines du kiste etoient trop profondes dans les parties, 6°. si Le kiste en duneextreme dureté et dune epaisseur Considerable de la tumeur du gros volume, 7°. La maigreur du kiste, formé depuis peu de temps, Linstrument tranchant ne faisant esperer les Les operations quavec Succes douteux et dangereux

raisons de preference

1°. si Lenflure et Le kiste ne occupe dans Les Les tegumens 2°. fait moins de perdition de substance, 3°. Lopposé a Lemorragie, 4°. par Lacquitte de Les Les Les done detruit avec matiere tres peu de donne plus de Liberté aux petits vaisseaux de la Circonference de la tumeur de fournir plus abondamment de la matiere, qui donne lieu au Retre du kiste de Les Les, ce qui fait craindre quil ne Reste de pus que la tumeur ne Reuienne ou que louverture ne devienne fistuleuse

dans Lattrome, La Steatome et le meliceris Le Couteau en preferable a Linstrument tranchant

1°. quand Le kiste en tres dure, de la matiere tres epaisse

ARC 51 n° 17

ce Cautere Condamné, 2° quand La tumeur a fait Corps avec
Les parties Charneuses, 3e non seulement que Les Racines Letendent
et profondent Jusque sur Les Ligamens et tendons mais
encore sur quelque periostes

raison de preference

1e non seulement Le Cautere emporte Le Kiste dans Lextendue
mais encore Il le Consume Jusqu'au Racine, ce qui empeche
Le Retour de La tumeur, et prouve que Les remplus sur quelques
1e quelques etuis quelques Glandes dans Lextirpation
de ces sortes de tumeurs par Linstrument tranchant, Une
Ligeure pas aisée en mesme possible dentuer Les adherences
du Kiste, ce que le Cautere fait, et prouve une ample
Suppuration, par Le Reste de Lescarre

Le ganglion arrive par Lordinaire de Lentorse des tuyaux
nerveux et des fibres du tendon, qui survient par Lordinaire
pour avoir fait quelque effort de bien penible
Il arrive encore de Lobstruction de Rheumes qui coulent
dans les petits tuyaux, Les quels Se tournant Comme et
se rangées Leur Route Interceptée Lorsque dans Les fibres
tendineuses. ces mesme Rheumes arrivans toujours de nouveau
La tunique qui enveloppe Le tendon se Remplis et se
gonfle et forme une petite tumeur et Kistée tres dure

Kistes que Le ganglion Cette Lection de la partie soit par
La grosseur ou par Lextreme dureté, ce qui est une preuve Le
mouvement, si Il Survient ce qui nait point fait corps
entier avec Le tendon, ou Les nerfs et ponctuation.
Il faut Les tirer avec Linstrument tranchant

Le Cautere est preferable a Linstrument tranchant
1e Le tumeur a fait Corps avec Les parties et dont
donné, 2e si Le Chirurgien trouve La tumeur Immobile
et Le Kiste tres epais et Les Racines profondes et
adherentes

raison de preference

Il brule par Les parties Charnues Le Kiste 2e donne
Issue a La matiere et Sanieuse et produit par La
Escarre de Lescarre une Suppuration, qui fait detacher
Le Reste du Kiste si Il y en avoit

La taupe est une tumeur et Kistée faite d'une

Limphe vere, epaisse et visqueuse sous les tegumens fait
obstructions sur les parties ou elle en deposé. Lacquumulement
de cette Liqueur epaisse et grossiere, le jour quelquefois
Longtemps sans blesser les parties, acquit faire quelle acquiert
son dernier degré daugmentation,
elle ressemble a ces eminences de terre que fait cette
animal en se fouillant
elle attaque le visage de la teste, et particulierement
les sutures du crane quelle cause des accidens tres fascheux
sitost que la liqueur acre et corrosif a consumé les
tuniques elle carie les os, et penetre quelquefois par les
Cellules ethmoides dure malade et pie mere elle detruit
quelquefois les tuniques des vaisseaux, cause lemorragie
et occasione des exfoliations d'os et autre difformité
Circonstances absolues qui engagent la Chirurgie de les extirper
Le testudo ou tumeur ressemblante a la taupe
mais plus molle, et plus grande, ne differe de la taupe
que par ce quelle en plus facheuse, quand elle a plus jouy
plus longtemps; ses racines, causes et les parties quelle
attaque sont les mesmes que celles de la taupe, et
par consequent la maniere de la traitter
Le Cautere dans ces deux tumeurs est preferable de
beaucoup tranchant
Lorsque le Kiste de la tumeur mesme sont devenus par la
suitte du temps dune grosseur et dune dureté considerable,
situés si proche ou quelquefois autour de nos parties
a la face a cause de la disgrace) ou quelle entretient
facheusement ne peut faire les operations qui sont si
dos advantageuses a cause de l'effusion des liqueurs
qui l'irrite obligé de faire
raison de preference
1re ebranlement le Kiste fait sortire une matiere epaisse
et Caseuse, et fait degorger par la grande suppuration
qui en est plus prompte et plus abondante les parties
Circonvoisines qui se trouvent engorgées a la suitte de cette
tumeur, par l'effusion de la mesme matiere et la perdition de
substance
Le bronchocele ou goitre est une tumeur ou poche qui
vient a la gorge, assemble dans son Kiste

ACAD. NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Le degorgement des vaisseaux Lymphatiques, et Lobstruction
qui se fait dans les glandes par laridité de cette liqueur
fait la matiere qui forme Le Squirre
La dilatation de la membrane de cette partie, les muscles
et le panicullement des filets nerveux, ne contribuent pas
peu a former Le Kiste de spe
Il Comprime quelquefois par son grand volume
La trachée artere, consequemment empeche La Respiration
Cause de linquietude et de la disgrace aux malades, et meme
par la perte de la Respiration met Le malade au tombeau
raisons qui engagent Le Chirurgien de Lextirper

Le Cautere en pre ferable a Linstrument tranchant

1° Si La tumeur en dure extreme grosseur, que Le Kiste
soit tres dure et que Le volume de la matiere soit
renfermée Comprime La trachée artere et empeche La
Respiration

Raison de preference

1° Linstrument tranchant a faire Les parties considerablement
par Le effusion du sang; et Le volume de La tumeur estant
Considerable, et Le Kiste tres dure, Il nest pas possible de
Le tenir, precaution Les Remedes fondans dont on seroit
contraint et bonne Chirurgie de se Servir, seroient trop Long
temps a faire Suppurer La matiere et Le pore Le Kiste
2° au Contraire Le Cautere brulle et emporte Le Kiste
et Ouvre par Lescarre de Lescarre La Suppuration

On extirpe Les tumeurs Laites d'humeurs
platreuses Lymphatiques a La nature de La graisse

Humeurs que La Cause nestant autre Chose que La simple
et La Grosse serosité Lymphatique Lorsque pour Lors de leurs
vaisseaux et Le degorgement Immediatement Lorsque quelque partie
de Ly Condensent et font tumeurs
et pour lors elle tend et Distend dans Le vuide des parties
ou elles sont epanchées Consequemment gesne et blesse
Le malade et cause La pluspart de la partie
raison qui engage Le Chirurgien de Lextirper
dans Lorsque Le Cautere en pre ferable a Linstrument
tranchant
Lorsque La tumeur en Considerable et que La matiere
endurcie en Leme petrifiée, et quelle en adherente aux
corps musculeux, Ligamens et tendons

raison de preference

Le Cautere Courbe Le tient ou la plus grande partie du Kiste et
de Latumeur consiste Les ligueurs dans les vaisseaux des
parties voisines, qui fondent et suppurant et font tout à
Le Reste du Kiste, au Contraire de Linstrument tranchant
qui Les en detache, par Lexcoriation des ligueurs contenues
dans Les tuyaux

On extirpe Les glandes endurcies.

1°. Les glandes du Col grossissent deviennent dures et Insensibles
et font autant de tumeurs quil y a de glandes,
On Les appelle scrouelles
Elles quelquefois deviennent molles, Elles suppurent
et deviennent, avec douleur et sans douleur, Ulcérées et d'autres
qui ne le font pas
Celles que l'on appelle Lymphatiques ne viennent pas seulement
au Col mais aux mains aux pieds et aux doigts
L'obstruction de la limphe, dans Les glandes du mesentere
Corrompt le Chile, avec La Matiere purulente des glandes
exterieures
Ces glandes tuméfiées deviennent souvent si Considerable
par Leur grosseur, que non seulement La beauté de la partie
en est perdue, mais même empeche Laction et Lusage
raisons qui engagent Le Chirurgien à Les extirper.

Le Cautere on preferable à Instrument tranchant

1°. Si Les tumeurs entiers dures fixes et en grand nombre
2°. adherentes aux os 3°. nouvrit et entretient de
plusieurs vaisseaux Considerables 4°. quand elles ne sont
Leur dernier degré d'accroissement

raison de preference

Il Ouvre, et Contient, et emporte Les Kistes ou poches
des Corps glanduleux, 2°. Il fait sortir par La suppuration
Le Corps de la glande endurcie, et La matiere epaissie
3°. Il empeche et Retient Le Reflux du sang que pourrait
faire Linstrument tranchant par La section des petits vaisseaux
de la partie ou est située La glande, 4°. a pres La chute
de L'escarre procure une plus ample Suppuration, non
seulement de La tumeur, mais encore des parties voisines, qui fait
de tout, Le Reste de la glande, et du Kiste, si il y en Reste

2e. Les glandes de ces environs tirent leur origine et consequence de la limphe qui se paissit de la condense dans les tuyaux qui enveloppe la glande.

La glande devient plus ou moins dure et plus ou moins grosse selon que les liqueurs qui y coulent s'accumulent, abondamment et lentement.

Il faut que la tumeur cause de la douleur au malade, quelle empêche l'action de la partie, quelle ne puisse se resoudre ny venire a la suppuration par son extreme dureté.

Il faut que la Chirurgie en vienne a l'extirpation.

Le Cautere est preferable a tout instrument tranchant

1e. A la tumeur glanduleuse ou considerable, par sa grosseur et son extreme dureté, 2e. quelle soit adherente a quelque partie importante, 3e. que cette meme partie soit etroitement garnie de plusieurs vaisseaux.

Raisons de preference

1e. Le Cautere en porte quoyque lentement, mais plus surement le Virus de la glande, 2e. par la fonte de la substance, procure une suppuration abondante qui degorge les parties voisines, 3e. s'oppose a l'hemorragie.

3e. Le corps glanduleux cutanée des parties exterieures et celuy des mamelles celui de quelques visceres, devenu squirreux, parceque l'humeur qui l'engendre en a corrompu et detruit les principes.

Quoyque toutes liqueurs qui circule dans les visceres, et celles qui s'arretent dans les glandes a la separation de quelque humeur, quand elle en arrete dans les cellules, et quelle l'engorge, occasionne des squirres.

Bien formé non seulement d'un amas de simple graisse et visqueuse devenu adherente, qui se caille, mais encore du lait des mamelles, et de la matrice.

Il faut considerer le virage, le feux, et la tumeur squirreuse, et consequence, le primitif secondaire et le simptomatique.

Quand le squirre en devient d'un volume assez considerable

et quil cause une douleur inquiette au malade, et quil
empeche Laction de la partie, si elle en a
Il faut Lextirper

et pour tenter dextirper calement Lextirpation, Il faut quil
soit tres dure, ny dans son commencement, parceque Lumeur
nest pas encore depose, ny Enflammee, ny seulement
dans les parties externes, mais encore dans les visceres

Le Cautere en preferable a Linstrument tranchant
1°. Si Latumeur Scirreuse et secondaire est adherente fixe
aux parties tendineuses et nerveuses et que le malade soit
dun temperament 2°. Si Latumeur estoit dun volume
Considerable sur le corps des muscles et quelle y fut tres
adherente, 3°. Si Latumeur Scirreuse estoit adherente a
quelques visceres de bas ventre, et que la situation du viscere
permit Lapplication

raison de preference

1°. Le Cautere brule, consume et ecchere toutes Latumeur
2°. fait degorger, a proportion de degorgement, par Lapparition
dans Les petits corps glanduleux engorgés vois ins de la
tumeur, 3°. en pose le Remontage et La Loy grande perdition
de substance que Loperation Contraint de faire par Linstrument
tranchant

1°. Les glandes des mamelles deviennent Cancereuse
et Carcinomateuse et quelquefois Les parties Charneuses
Les glandes des mamelles des femmes Ledeviennent plus
volontiers que celles des hommes
Le Cancer est ulcere ou manifeste
Le manifeste ou Elevé ou noyé ulceré
quand Le Cancer est dans Le dernier degré Il est entouré de
grosses veines Varicqueuses, ressemblent a des aux pieds
de crevettes
La Cause prochaine et Immediate de Cancer est un vice
Scorbutique, une liqueur acre, Corrosive et Rongeante
occasionant beaucoup de desordre, selon Les sels
contenus dans cette liqueur Lexaltent et fermentent
Les praticiens dans Leur degrés Le regardent aussy

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

eme ny sang predanie par lui mesme, 1.o si il devient trop epais, ou trop Rarefié, 2.o si les vaisseaux le trouvent comprimé ou degré par laction de quelques corps exterieures Le sang porté par les arteres ne pouvans absolument etre re pris par les veines, le panche se Rompit, venant de nouveau, fait gonfler la partie, tous les petits filets nerveux, qui environnent de toutte part la tumeur, Leur oscillations Interceptées, Leur mouvement retardé tant de fois contre la directé Sfigmeuse, le monde peut devenir Irregulier, par Lebranlement, et va Jusque au Coma faire la triste et fatale Impression, Sitot que le sang venant a etre arrêté dans Son mouvement Circulaire, toutes les veines des environs Engorgent et se tumefient et deviennent Varqueuses et donent a la partie la couleur plombée

quand la tumeur Commence a se faire connoitre on que le Chirurgien, la distingue pour ce qu'elle doit etre dans quelle etat quelle soit, noy ployé si les forces, lage, le temperament le permettent de faire l'extirper

Le Cautere est preferable a linstrument tranchant

1.o Lorsque la tumeur est fixe et adherente aux os et aux Cartilages et que le fut les glandes des mamelles 2.o que tout le Corps glanduleux fut endurci sans etre Sfigmeux 3.o que toutes les parties voisines de la tumeur et de la partie fussent bouffies

raison de preference

1.o Le Cautere consume et emporte la tumeur, 2.o loppose a lemorragie qui est Mentielle et elle est 3.o apres La chute de lescarre procure une abondante Suppuration est fait et faisant degorger les parties voisines. 4.o ameine la perdition de substance que lescarre contraint de faire par linstrument tranchant

Operation Les tumeurs qui ne contiennent que une matiere

Les varices sont des tumeurs ou eminances efgmeuses qui arrivent sur la surface de la peau, occasionnées par les liqueurs nourricieres, les quelles estant devenues

aere dans les petits vaisseaux les desfirens, extraitalone 11
et coulent alors
Il y a de superficiel et de profond
Le profond dont les Racines sont dans les fibres nerveuses
et tendineuses gesne laction de la partie, cause de la douleur
raison qui oblige Lopperation a lextirpas
Le cautere expressable a linstrument tranchant
1°. Lors que la tumeur des Racines profondes dans les parties
nerveuses et tendineuses, 2°. quelle est dun volume
considerable, 3°. dune dureté extreme en quelle Interdit
quelque faction de la partie
raison de preference
1°. Le cautere emporte Latumeur et donne les
adherences, 2°. Lopposite a Lemorragie et epeine pour faire
Linstrument tranchant, 3°. a prevenir Lesquette de les desfaire
procure une ample suppuration, qui fait tomber les
Racines
Le fungus est une tumeur faite par Lextravasation de quelque
substance et molle comme sont les champignons
Il vient de la dilatation et du desfirement des membranes
ou du Relachement des tendons, ou de quelques parties nerveuses
meurtries
La consistence en molle et spongieuse et blanchatre, elle
est peu sensible et douloureuse, elle augmente de jour a autre
Lors que cette eminence efatteuse, bleste et Incommode
Le malade par son volume et situation; Il faut Lextirper
de peur que la tumeur ne devienne cancereuse, acquis dutout
Im possible de Lextirper
Le cautere est preferable a linstrument tranchant
1°. Lors que la tumeur est grosse quoyque molle, 2°. quand
La partie et La tumeur ne permettent point Lextirpation avec
Linstrument tranchant
raison de preference
Il enleve et consume La tumeur dans tous les corps, 2°. Suppose
a Lemorragie, 3°. procure une plus prompte suppuration
Le sarcome est une tumeur fonde et Charneuse qui attaque

Indifféremment toutes les parties du corps. Elle n'est moins mauvaise, lorsque les parties ou elle arrive
quand elle arrive aux os, et n'a point les racines si profondes
que le polype
La bondance d'une nourriture trop visqueuse qui s'échappe
dans les espaces des fibres, y donne à une humeur
acre cause des tumeurs
quand cette tumeur cause au malade de l'inquiétude
et de la douleur, en quelle augmente de jour en jour dans quelle
état et quelle partie qu'elle soit située il faut l'extirper;
de peur qu'il ne survienne un volume trop considérable
qui le rende dangereux au malade.

Le cautère en préférable à l'instrument tranchant
1°. dans les grandes plaies, si elle est située sur l'embouchure
de quelques gros troncs considérables de vaisseaux 2°. sur
quelque aponévrose, ligamens, tendons et les nerfs
3°. lorsque quelques parties voisines, 4°. sur les corps musculeux

Raisons de préférence
1°. Le flux de sang que cause l'instrument tranchant
trouble et empêche le pansement de la plaie: au lieu après
l'extirpation de la tumeur quand elle est seule, la tumeur
est pansé par le cautère, 2°. après la chute des escarres
nous trouvons et augmente la suppuration, 3°. nous suscite
une plus grande perte de substance

Le pis que l'on peut mettre au nombre des tumeurs
ou excroissance charneuse, faite des parties grossières
d'une nourriture, qui sont devenues visqueuses et épaisses,
et les acides qui se sont embarrassé dans les glandes
et dans les petits tuyaux de la peau eut égard à leur
densité et à sa trop grande consistance, deviennent squirreuses,
mais sitôt que l'acreté domine dans le sang, il dégénère
en cancer
Si le malade est jeune et vigoureux et de bon tempérament
il faut l'extirper dans le commencement

Le cautère est préférable à l'instrument tranchant
1°. Si l'os adjacent, et situé à quelque partie qui
ne permette point l'action de l'instrument tranchant
à cause de l'effusion de liqueurs

raisons de preference

1.o Le Cautere agit sans ouvrir ny offenser dans les commencemens quelques vaisseaux ne se developpent, et le Contenu entierement Le tumeur, ce qui empesche l'Emorragie, et procure une ample Suppuration, qui entraine et consume tout ce qui Le Reste des racines de la tumeur s'il y en avoit

Pourquoy certaines tumeurs doivent estre simplement ouvertes, quels sont les Cas ou le cautere est preferable a l'instrument tranchant et les Raisons de preference

La pratique ordinaire de la Chirurgie nous enseigne que les tumeurs qui doivent et peuvent estre simplement Ouvertes par le cautere, preferablement a l'instrument tranchant

Sont toutes les tumeurs faites d'humeurs putrides, qui alterent l'action d'une partie et qui changent la figure comme la Composition,

et ont toujours pour cause, l'abondance de la Lymphe rouge ou blanche, et passive ou acre, delicatesse, relachement, flexibilité des tuniques des vaisseaux qui les renferment et contiennent

quelques coups, chutes, compressions ou effort violent y contribuent, cette Lymphe plus ou moins fluide comme aussy plus ou moins profonde et posée sur les parties tant internes que externes, et qui les blessent par son poids et son sejour

Le phlegmon, la parotide, le panaris, le bubon, le phyma, le furoncle et l'antrax, le recipelle, l'oedeme et l'hydrocelle et autres toutes faites de cette Lymphe qui a rompu les tuniques de ses vaisseaux, s'en a epanchée et deposée et changé en pus ou matiere, qui en suite a animée une partie ou detruite de son tout ou Ressort et convertit en eau

Dans les coups ceux qui sont fait par Instrument tranchant, ou arme a feu, et ceux qui attaquent le corps des os comme la fracture ou la luxation, ou la carie

comme le nodus

Ces tumeurs arrivent plus volontiers par fluxion et rarement

par congestion et se terminent par suppuration

Lisses y parvenant absolument necessaire pour le soulagement de la guerison du malade. 1° parce que toutes les lignes deposées sont des vaisseaux sur quelque partie fermente avec trop extreme tension et dilatation. 2° par ce sejour gate et corrompt les parties sur les quelles elle est epanchée cause encor aux vaisseaux voisins de leurs tuniques et laquelle impuissance de la partie et verse meme la partie, q.e le Medecin qui le fait et ses lignes aigre dans la matiere d'usang, avec la fievre vers vers et convulsion et autres accidens. 3° de crainte que les vaisseaux ne se painent, et ne se rendent trop sejour

Le sautre dans des cas l'emporte sur l'instrument tranchant pour la guerison des tumeurs

1° Le phlegmon est une tumeur sumorale avec douleur chaleur tension et pulsation

La plenitude des vaisseaux sanguins par une partie et les grand reflux, sur defaut de circulation, et en consequence leurs engorgemens considerables, fait une elevation bien marquée, l'opposé au mouvement d'usang et les tuniques des vaisseaux a la circonference de la tumeur

Il faut considerer dans le phlegmon le vray qui vient de cause interne, et le faux qui vient de cause externe

Le vray vient de la grande abondance d'humeurs d'ans les vaisseaux sanguins, ou de leur acrimonie qui a rompue les tuniques de leur vaisseaux, et leur epanchée

Le faux vient a la suitte de quelques playes, corps, chutes, luxations, fractures et cause violente

Il y a aussy des phlegmons, simples, salutaires, dangereux pestilens, malins et venemeux

Il faut considerer en general dans le phlegmon abscedé celuy ou tumeur s'en deposée dans quelques extremités comme les bras, cuisses, jambes, pieds et mains, ou dans quelques cavités principales, ou a la suitte de quelques viscres abscedé comme au bas ventre, le foye les Reins, le Epiploon, le mesentere, le pancreas et les Reins

Sitost que la matiere en faite et que les pores sont

Les parties sur les quelles elle en deposé, quelle en est la cause
Laction, et quelle Reflue dans le sang y cause fievre continues
flux de ventre et autres accidens facheux, d'ou vient qu'on
nomme cet Contraint delement

Le cautere est preferable a l'instrument tranchant
1.° Lorsque la matiere est profonde, epaisse et que la Cuticule
ou la peau nerveuse pour l'ouvrir 2.° La suppuration tres
forte et occupant une trop grande etendue n'entretant pas
assez accumulé 3.° quelle partie soit garnie de Corps musculeux
et de vaisseaux

raisons de preference
Il fait moins une plus grande Ouverture que la partie
interessé ne permet et qu'elle seroit contraint de faire avec
l'instrument tranchant, 2.° donne issue plus douce aux
matieres, 3.° fait cesser la longueur et la grandeur tant du
pensement que de la suppuration, 4.° Il anime par les parties
Caustique les parties voisines et environnantes desquelles la
matiere est contenue, leur donne par la chaleur de la
fievre et par le degorgement plus de fluidité 5.° fait
cesser l'ouverture des vaisseaux que les rend contraint
de faire et autres parties interessantes pour donner issue
aux matieres, 6.° Le sang contenue dans les tuyaux etant
trop epais et Rallentie dans son mouvement, le cautere le
reveille et le Ranime et est plus disposé a se degorger et
les matieres plus faciles et plus prompte a se former

1.er des parotides
Les parotides, sont des glandes du Col qui le gonflent et l'enflamme
le Conduit de rablement, quelle font une tumeur que le nomme
d'meme nom, ces tumeurs deviennent et de mauvaise et
quelque fois facheuse
dans les fievres acigues et malignes elles sont critiques
ou simptomatiques
quand elles sont critique, le visage devient Rouge et
gonflé la tete un pesante et lourde, il survient une
pesanteur dans les membres, la fievre se termine par ces abces
dans ces glandes
Les parotides sont toujours dangereuses a cause du voisinage
du Cerveau et de la Continuité des nerfs
Les parotides simptomatiques sont toujours tres a craindre
parce qu'elles se resolvent d'abord et par consequant ne
se suppurent point et que la fievre se soutient toujours

Leur Cause ou Embarras de la Circulation dans toutes les Sécrétions
nourrissent Souvent dans les glandes, qui Cause ce testumeurs
et Conséquences de l'obstruction Squirrheuses
quand Latumeur est molle ou a tres peu de
Volume Considerable et quelle est peu douloureuse Lorsque des Glandes
et de la Respiration, le Cancer est Couvert, Craintes qu'elle
soit Squirrheuse

Le Cautere est preferable a l'instrument tranchant
Lorsque Latumeur a acquis de Gros Considerablement et
que les Liqueurs Lymphatiques Condensé dans les glandes, et que
Cette engorgement empeche La Circulation et La Respiration

Raison de preference
Le Cautere par la Chute de l'escarre, ouvre et donne Issue
au pus Condensé et Epaissi, 2°. Il fond et Consume les
glandes engorgées, 3°. procure une simple Suppuration,
4°. empeche la perdition des substances que fesoit L'instrument
tranchant

3°. Le panaris est une tumeur qui vient dans les Articles
ou Phalanges des doigts, et particulierement a leurs extremités
Vers ordinairement Suivie de Chaleur, douleur, fievre, dont
tous les Chirurgiens et Empirique, emportent
Marrine des Simptomes, Convulsions et defaillances
La Cause en toujours et pour Ordinaire, Vif sang aigre
et acide epaissi par des Tuyaux qui fermente
La Simptose comme Le sang acre qui brise les tuniques des
Vaisseaux, dans les quelles elles Contenues
et quelquefois Le sang vicié dans tous les Corps
quelque fois une petite piqure ou grande Contusion; donne
Lieu aussi a la panerie

Deux Especes de simples et de malins

Le Simple est 1°. Celuy ou les Liqueurs sont Contenues
entre les Tegumens et les muscles, qui Cause de moindre
accidens, Le 2°. est Celuy ou les Liqueurs sont Non formées
dans La gaine d'Extendons et Cause des accidens plus
Considerables

Le malin est Celuy ou les Liqueurs sont Non formées
entre Le periosté et les Os. Les accidens, sont quelquefois
Si facheux que la partie tombe en gangrene
Dans quelques peu de panaris que Lorsque Si le Chirurgien
ne leve de Le panerisme de bonne heure, de quel Volume
que soit Latumeur, Il doit Leur donner Issue

Le Cautere en preferable a linstrumen tranchant ... 14
dans le troisieme ordre de panaris, quand la matiere est
a paine se fendent, entre le periosté de l'os, et la partie tres
dure de la peau
raisons de preference
1er Douleur, comme il emporte l'humeur, 2e que par l'ouverture
la matiere se fendant, elle ne s'extravase dans le vuide des parties
3e fait la Exfoliation de l'os souvent altéré
4e Bubon
Il y a de trois sortes qui attaquent ordinairement le Corps
glanduleux des emonctoires, Le benin, Le malin, et Le venerien
Le benin Suppure aisement
Le malin, et le venerien, sont Difficile a distinguer l'un de l'autre
Le bubon malin est toujours suivie d'accidents fascheux, comme
Rougeur, douleur, fievre et souvent mort en vingt six
Le venerien vient d'abord accompagné d'autres accidents fascheux
Il vient toujours a la suitte du Coit impure
Le bubon malin differe encore du venerien en ce qu'il
attaque indifferamment tous les emonctoires
la cause en la mesme que celle du Bubon Critique
Suppure et le Symptomatique ne suppure point
quand a la guerison du bubon malin apres avoir fait prendre
au malade Les Remedes convenables, il faut conduire
la tumeur a suppuration
dans ces deux especes de bubon, quand ils sont considerables
Le 3e crainte qu'il n'entre la malade, par la Retrocession de
son humeur maligne dans le sang
et Le 2e ne donne la fistule, Le Chirurgien doit les ouvrir
promptement dans leurs temps
dans Le 1er Le Cautere en preferable a linstrument
tranchant
Si l'humeur se posé entre tres a paine, et Latumeur dure
jusque la fluctuation, apres Les Remedes convenables sur
le temps considerable sans la faire Cautere
raisons de preference
1er L'ouverture Latumeur en donne Issue a la matiere, 2e fait
fondre Le Corps glanduleux endurcie, 3e par la petite de la cicatrice
procure une a nuple suppuration
dans Le 2e Le Cautere en preferable a linstrument
tranchant
Lorsque la tumeur en tres dure a laquelle on peut venir a suppuration

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

par les Remedes ordinaires et convenables, et qui n'ayt
Lanytamais que le malade la porte et quelle ne soit
Considerable

raisons de preference

1° Il ouvre, meurit et enleve la glande obstruée, 2° il
procure une suppuration abondante 3° La perte de
Substance n'est pas si Considerable par le Cautere que celle
Le fait et elle est plus tranquille

5° **Le pfyma** est une petitte tumeur qui attaque les
glandes miliaires de la peau. Il cause beaucoup de chaleur
et est pendant moins Considerable par l'etendue de
La partie que le pfyma occupe
Les hideurs depend de la figure de chacune des petites
glandes de la peau et de la couleur
de ces petits tumeurs
A la difference de pendant que le pfyma est une tumeur
des glandes de la peau et le Carcinome Le pfyma n'est
ni palle ni Inflammation des petites glandes de
la peau, et qui fait que le pfyma suppure
N'arrive pas ordinaire aux petits enfans et Indifferamment
a toutes les parties du Corps
Si la tumeur par son Inflammation et son extreme dureté
et sa Volume Considerable dans son espece et quelle
occasione beaucoup de douleur au malade, et entretient
La fievre, le Cirurgien dans l'egard est contraint de
Louvrir, pour a pacifier l'accident et soulager le
malade

Le Cautere est preferable a l'instrument tranchant

1° Si la tumeur est dure et quelle ne peut venir
a Suppuration, 2° si tous les petits corps glanduleux
rouge, tendue, et enflammé, et mesme amassé, ne
Les disposant que la tumeur et que l'Homme ne puis le
Supporter, ny Chirurgie operative ne puis

raisons de preference

1° Le Cautere a pres la cheute de son escarre, ouvre et
amollit La tumeur 2° en fait sortir le pus 3° emporte
et degorge par la suppuration les corps glanduleux, 4°
S'oppose a la perdition de substance de l'instrument tranchant

6° **Du Charbon et de l'anthrax**

quand les parties sulphureuses du sang sec Cause et son
flamme, et quelles se pandent par dehors par la voye
de la partie, elles Causent des maladies des plus fascheuses
a peine peut on quelquefois les Connoistre quelle est leur

Le malade
est le Charbon ou Lanthrax.
quand il survient sur une partie quelconque du corps une tumeur dure et douloureuse
suivie de plusieurs petites vessies, et au milieu de la tumeur
une croute noire, sous laquelle la peau est tumefiée gangrenée
et quelquefois mesme pourrie, suivie de fievre violente,
mouvement convulsifs, vomissement, soif ges entieurelles
et delire, on appelle cette maladie le Charbon
anthrax quand elle attaque les parties tendineuses laquelle
nest pas suivie daccidens si facheux
Mais vrayement que Lanthrax est toujours seule et le Charbon est
suivie de plusieurs, et attaque indifferamment toutes les
parties
dans le Charbon comme dans Lanthrax il faut promptement
enlever toute la tumeur, pour eviter les progres des accidens
que causeroient La mort au malade
Le Cautere le remporte sur linstrument tranchant
si a pres lusage des scarifications et remedes onguents
et emplastre convenables faites et appliqués, au milieu
de la circonference de la tumeur et de telle sorte elle reste
sans se separer point il faut se servir du Cautere
raison de preference
1° il consume sur le champ ou en peu de temps le sejour
de la pourriture et va plus que aucun, 2° il empesche
laugmentation, 3° procure une suppuration abondante
et fait degorger les parties voisines qui sont tumefiées comme
etranglées
4° Le Erisipelle est une tumeur generale avec Rougeur
considerable, et dune chaleur brulante
Il est accompagné dune grande Inflammation, qui vient
de la plenitude du sang dans les vaisseaux et de son
de la circulation dans la partie quil attaque, pendant le
temps il survient des petites vessies sur la peau qui rendent
une eau claire, qui nest autre chose que une limpfatique
qui sort de ses vaisseaux, et dans le declin le malade
se tombe par ecailles, et la peau se prend la couleur
naturelle
Le Erisipelle se porte et change Lui mesme de place, tout
a coup il sort que de une partie quil Reviens sur une
autre
La cause procheine et Immediate de Le Erisipelle est donc

La fausse circulation du sang dans la partie, la force
agitation et la force tention des petits vaisseaux
tous cequi bouche les pores de la peau et empesche la transpiration
comme un grand froid, l'eau froide, la neige et la glace;
dans les playes les Remedes qui bouchent les pores de la peau.
Dans les fractures et luxations, le bandages et pensement
tous la curation des erisipelle
Il est simple et vrays, quand il est accompagné des
accidens et dartres
composé et faux quand il tient de la nature des autres humeurs
Le erisipelle Cadinise et critique et simptomatique
critique quand il vient dans une fievre maligne
simptomatique quand il survient aux fractures et luxations
Il faut considerer encore celuy qui vient des pores de la
peau obstrués non suivie d'aucun accidens facheux;
mais celuy qui vient du vice du sang et toujours accompagné
et succedent les uns aux autres.
Dans la declinaison quand les hiqueurs ont abandonné
leur tuyaux soit par leur acrimonie, ou par trop
grande abondance, et quelles tombe à pareses, ou sur la
surface des muscles, ou plus profondement, et mesme
dans les extremités
et quand cette maladie a attaqué les visceres du bas
ventre, et quelle a pris la voye des suppuration, et que le
malade a eu la force de resister quelque espandant
il a ejecter sur le champ et saigné. Sedit des bas ventre
parceque le malade resiste plus volontiers aux erisipelles
des visceres de la ventre qu'aux erisipelles des deux autres
ventres
La matiere formé pesantes par leur poids et son sejour incommode ane-
cessairement la viscere, ou la partie sur laquelle elle est deposé
Il faut que le Chirurgien leur donne issue, de crainte qu'elle
ne face, gaste et corrode cette mesme partie
Le Cautere est preferable à l'instrument tranchant
1° Si la matiere est profonde et epaisse tenu dans les facultés
principales, que dans les extremités 2° que la paisseur de la
profondeur de la matiere, ne change point la couleur de la peau
en la partie, 3e que la fluctuation ne se fit sentire que tres

Imperfaitement, 4° que la partie fut gonflée de vaisseaux et
Examens entendons

raisez de prefrence

1° Le Caractere que la tumeur donne d'Elle a la notice 2°
Lapposer a la grande perdition de substance a Lemorragie de
Cette Espece 3° dispose La notice par la portion Circulante 4° procure des
abondantes suppuration, 5° Ouverte et Retirée partie La
grande douleur, que Lon Contraint souvent de faire tant
dans La partie que dans Le parenchyme

2° **de Lodeme** ou une tumeur faite de notice
Jaunatre blanche molle, Lege, Indolente, froide sans
douleur et sans Reflux, occasionné par une abondance de
Serosité

La Cause prochaine et Immediate de Lodeme, est donc une
grande abondance de Limphe tres Reuse
tout ce qui Comprime, obstrue, Ligature portion de ce qui
Rend La circulation Lente difficile a Cuire dans
Les grandes et petites Veines
Les alimens ou medicamens qui rendent La Limphe
Reuse occasionent Lodeme, Laire froid ou aquatique
Grand Brouillard fleur de Sereine, Hysteres et Colliquatifs
et autre Inconvenient de cette espece

Il survient aux plaies fractures Luxations et aux
parties voisines des phlegmons ou Erisipelles

Il se fait connaitre par la veue et Le toucher, et Lupuncture Lenome
Le nome tumeur Edemateuse

Si vous Comprimé Lodeme que Limpression de Lorgane se
que La tumeur y prenne dabord, Cest une marque
que Les Vaisseaux sont encore Entonné de leurs propres
humeurs

Mais que Contraire si en Comprimant La tumeur Lodeme
de La Reduction ordinaire, Cest une marque que les
Vaisseaux sont sans de leurs humeurs et que leurs extravasations
Laisse Un grand Relachement dans La partie

Lodeme est ou Simptomatique ou Essentielle
Simptomatique quand Elle accompagne de grandes
maladies
Essentielle quand Elle est bornée a la partie
Lodeme que Contre nature Elle se trouve quelquefois accompagné par Lerisipelle

Le dernier en universelle Lorsque le corps est tout Bouffi par la serosité
quand Il en moins gonflé, c'est ce que Leu appelle matie et anatorque quand Il en davantage.
Le dernier qui n'attaque que une partie est plus aisée a traitter que celuy qui attaque toutes les parties, et qui est occasioné par le vice du sang, et par les antiennes obstructions des visceres
Le dernier Vrage se guerit par les diaforetiques, transpiratifs et purgatifs
Le sang qui tient de la nature du phlegme, et la pituite se forment souvent par Inflammation
Quand Le dernier se termine par Inflammation et que la matiere elle ne sort seulement Lactive des muscles, mais encore quelle vicie soit le corps de la vie et le visage, et fait que le Liquide Luy donne issue, de peur quelle ne fasse perdre par son sejour, Lactivité de la partie aux extremités; qui la vie au malade, quand elle en a pansée Lorsque quelques visceres dans quelques cavités principales en sont atteints suivis et permette Lexpulsion
Le sauteur en preferable a linstrument tranchant
1° Si La matiere en profonde et petite et visqueuse 2° que le de port de la matiere soit Lorsque quelque visceres de bas ventre ou Lorsque quelques extremités, 3e que la putrefaction fut Insensible de la couleur et de figure naturelle de la partie ce fut point Gangrée, 4e que La tumeur petite Voulut prendre La voye de suppuration
raisons de preference
Il anime et met Lactive, une tumeur Laquelle par elle mesme en destituée de ses principes 2e ouverte La tumeur et donne issue a une matiere epaisse et visqueuse 3e accumulée et de port Tumeur qui nerfs Lorsque glissée et Insinuée dans les pores des fibres, ou dans differens Vide naturelle, 4e procede par La fonte des Solides une Inflammation, qui degorge et debarasse La partie, 5e empesche et oppose a la perditions des substances que Les Sucs contraint de faire par Instrument tranchant pour vuider La matiere, 6e si La partie estoit garnie de vaisseaux, Ligamens, tendons et nerfs, qui preuient Lemorragie

De l'hydrocelle en general tumeurs aqueuses et sans poche
Definition pour avoir abondance excretion de serosité, qui l'humeur
Le scrotum avec la tunique le paroit quelquefois quelle
quand elle les parties internes, sur les quelles elle exerce
et les fait retirer, comme les testicules et la verge dans
l'aine

La tunique vaginale observe, le paisseur de la peau considerable,
la fluctuation tres profonde, le dartos d'une duretè extraordinaire
quand les circonstances le permettent, il fait quelquefois
donner issue a la matiere de percer plus tot sejour elle
ne pourrait les parties, sur les quelles elle porte et abreuvées
ce qui causerait un dommage considerable au malade

Le taxeur est preferable a l'instrument tranchant
1° pour les grandes hydrocelles, apres lesquelles de
l'instrument tranchant, la poche la plus fluide et la liqueur
contenue la vaine, et la plus saine reste, par le gonflement
qui se fait de tout le corps de la bourse, qui empeche
seulement de porter les remedes, mais encore occasione
la recidive de la tumeur, ce qui n'arrive point par le taxeur

raisons de preference
1° le taxeur n'irritant point le scrotum et le dartos occasione
par le trocart de beaucoup moins d'inflammation qui s'oppose
a une reunion si prompte, 2° donne issue au pus grossier
et epais et fait que le chirurgien porte plus facilement
les remedes convenables qui peuvent en procurer la tumeur
et reunion

Les tuteurs qui sont faits par l'instrument tranchant
contondant, qui arme de fer, et leur qui attaquent
le corps de la comme la fracture et la luxation et la suppuration
comme le rendus

Dans les cas ou ils sont faits par l'instrument tranchant
ou contondant
1° par l'instrument tranchant lorsque le corps de quelque
vaisseau le tunique ou par totalement occupé, que les
liqueurs le long profondement de poche et que le corps musculeux
tendineux, et nerveux le scrotum si delicatement garnis de
graisse, par le plaisir qui fait le tranchant de
l'instrument dans ses fibres, et que l'ouverture de l'instrument
soit petite qu'une portion du sang la fermentation
lente dans le lieu ou elle est contenue et consequence des

epaissir, et les parties sur les quelles elle a penetré s'enflamme
par la suite, et se perd, et dans l'état de Mortification d'être
2.e par l'extrémité entendant le sang se trouvant long
temps gesnée dans son mouvement circulaire par la violence
du coup; l'ébranlement qui a Rendu les tuniques des
Vaisseaux et des fibres musculaires des parties voisines,
Le 1.er qui porte et qui ne peut plus Revenir, Le 2.e qui
tend à consolidation la partie
toutes ces causes obligent par consequent les tuniques de
la Rompure et le sang de se degorger peu à peu et en abondance
et de se deposer sur les parties defermentes et de les boucher par leur
poids et leur sejour
3.e par comme a fait lorsque le corps etranger a meurtrie et
Rompue par la violence, non seulement les vaisseaux,
tendons fibres nerveux, et les muscles, mais encore les os
4.e dans les fractures lorsque les os sont Rompus
dans leurs corps ou extremités considerables, avec un deport
considerables, occasioné par un grand nombre de quelles qui
rend pas possible de pouvoir toutes les Reunir, lesquelles
par leur inegalités, blessent, declirent et Rompent
Les muscles, les fibres tendineuses nerveuses et les vaisseaux
causent l'inflammation, et entretiennent le gonflement
5.e dans les Luxations, la violence que fait le
deplacement de la tete de l'os pour sortir de sa cavité,
Rompt quelquefois les vaisseaux de la cavité, le sang
se panche et fermente, sur la peneuse des muscles
de la partie et sur les extremités de ces mêmes os
quand dans ces differentes maladies, le sang sejourne
trop longtemps sur les parties, qui le convertie en pus
Il les gonfle et corrode, les corps etrangers lancés
avec violence qui meurtrie toutes les parties qui la
rencontrée; les corps etrangers le percé d'une partie dure
qui blessent et piquent continuellement les molles le
deplacement de ces mêmes parties si il n'est promptement
reunis, tendent considerablement les molles, occasione
une douleur tres vive
La fievre continuelle de la flux de ventre sont toujours la suite
d'une matiere epanchée qui reste dans le corps dans le sang

Lextremetté, rougeur perte, gonflemens et douleur considerable
sont toujours Les suittes des corps etranges et douleur plus ou moins
aquiblessent par les Inegalités et leur poids Les parties molles,
la difformité de la partie et la difficulté de la mouvoir
et de la mettre quand il y a des ligueus epaneses
A tous ces accidens il faut aplie le Chirurgien y remedie
promptement, lors qu'il le malade peut.

Le Cautre est preferable a linstrument tranchant
1°. Lorsque les matieres sont profondes et deuenues tres epaisses
par leur sejour dans la partie et ont Rendu le fond de la playe
Caleuse, les orgueilles trop Longtemps a se separer.
2°. La Carie ou noiseux de los qui fait faire exfolie et
souuent estat corps etranges qui de se peut qu'il nest pas
possible de pouuoir faire sortire tout a coup, 3x
3°. La situation de la partie quand elle est garnie de corps
charneux tres epais et de diametre considerables, comme
la poitrine aux bas ventre aux cuisses et quelquefois
aux mains et pieds

Raison de preference

1°. Une simple incision faite auec linstrument tranchant
Les matieres viciées les parties se retrecissent et se rapprochent, ou
Loge beaucoup de peine a porter les remedes salutaires, ny seulement pour detruire la Carie des os,
mais encore pour consumer les chairs Caleuses
2°. par linstrument tranchant La playe se referme souuent
et par Les Loy on contraint de faire une seconde ouuerture
et quelquefois dauantage, et qui Loy enuie par le cautre
3°. Loy en obligé dans bien des cas de retirer Les Leures
que fait le Cautre, ouuert par le partage des orgueilles
et qui repoussent faire linstrument tranchant

Le nodus est une tumeur faite de ligueus epaneses
entre le periost et le corps dels, que forme une Circonference
plus ou moins grosse
La Cause en soit une tumeur maligne ou veroliques
mais pour lors elle resistent quelques passant par les grands
remedes, il survient aussy a la suitte de quelques grands

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Coupe ou Cautere
Vien advenir de ne remedier a poinct
quand il Cleve Considrablement la partie et quil y empesche
Lection, et que le Chirurgien ait mis et usage les dans
et les Resolutifz les plus puissans, Il faut Louvrir

Le Cautere est preferable a linstrument tranchant
1° Le Cautere par la Calidité animie Laliqueur et partie
et luy donne Issue, 2° empesche lhemorragie et les progres
de la tumeur, 3° fait que le Chirurgien porte plus aisement
Les Remedes Convenables

raison de preference
1° dautant que Les nerfz en pleurent et plus prompte
2° soppose a la perdition de substance que lesprit contraint
de faire par linstrument tranchant

Il faut que le Chirurgien observe que le Cautere
soit appliqué generalement dans toutes Les tumeurs pour
les extirper, comme pour les Ouurir
1° sur letendue du volume de la tumeur
2° que lescharre Coupe Le Kiste dans Les tumeurs a
Kistes, et ne porte La glande dans toutes celles qui sont
ondoyes, et quil ne laisse aucune partie de la glande
et du Kiste de Crainte que la playe ne Reste fistuleuse
et ouure Le passage dans les matieres Sumorales
3° que son effet soit prompt
4° Il faut scauoir que le Cautere ne blesse par son long
sejour, quand il est trop fixe, les parties Intercedentes
comme Ligamens, tendons, arteres, veines et les membranes
et quil suruiendroit Inflammation, Hemorragie, grande
douleur et Convulsion
6° que le Chirurgien connoisse bien la partie et si
elle luy permet La Cauterisation

Circonstances quil faut que le Chirurgien connoisse
pour son honneur et la guerison advantageuse du
malade